



PROTOCOLE EN CAS DE DOULEUR THORACIQUE FLOWCHART

S'IL S'AGIT D'UNE DOULEUR D'ORIGINE TRAUMATIQUE, SE RÉFÉRÉ AU BON PROTOCOLE TRAUMATIQUE.

LES DOULEURS THORACIQUES PEUVENT PROVOQUER UN ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE. SOYEZ À L'AFFUT !

LE SECOURISTE GÉNÉRAL NE POSSÈDE PAS D'ASPIRINE (ASA) NI DE NITROGLYCÉRINE (TNT) DANS SA TROUSSE DE PREMIERS SECOURS ET N'A PAS LA RESPONSABILITÉ D'EN ADMINISTRER.

UNE DOULEUR THORACIQUE PEUT RESSEMBLER AUX SIGNES ET SYMPTÔMES D'UNE INDIGESTION. SOYEZ PRÉCIS LORS DE VOTRE QUESTIONNAIRE AFIN D'APPLIQUER LE BON PROTOCOLE D'INTERVENTION.

SI VICTIME PRÉSENTE DES DOULEURS THORACIQUES QUE VOUS LES SOUPÇONNEZ D'ORIGINE CARDIAQUE, VOUS POUVEZ ENCOURAGER LA VICTIME À PRENDRE QUATRE COMPRIMÉS DE 81 MG OU UN COMPRIMÉ DE 325 MG D'ASPIRINE À CROQUER SI LA VICTIME N'EST PAS ALLERGIQUE OU QU'ELLE N'A PAS EU D'HÉMORRAGIE RÉCEMMENT. MÉDICATION NON RÉPÉTABLE.

PROTOCOLE EN CAS DE DOULEUR THORACIQUE

FAIRE CESSER TOUTE ACTIVITÉ, DESSERRER LES VÊTEMENTS ET FAVORISER LA POSITION DE CONFORT

EST-CE?

UNE DOULEUR AU NIVEAU DU THORAX, RESENTIE SOUS FORME DE SERREMENT, DE PRESSION, D'ÉTAU, D'ÉCRASEMENT, D'ÉTOUFFEMENT, DE POING OU D'INDIGESTION ET D'UNE DURÉE CONTINUE DE MOINS DE 12 HEURES, QUI N'EST PAS LIÉE À UN TRAUMATISME ?

UNE DOULEUR CONNUE, CONTINUE DE MOINS DE 12 HEURES, SEMBLABLE AUX DOULEURS ANTÉRIEURES DÉJÀ RESENTIE CHEZ UNE VICTIME AVEC UN DIAGNOSTIC DE MALADIE CARDIAQUE ?

OU

OUI

LA VICTIME A-T-ELLE PLUS DE 35 ANS ?

NON

LA VICTIME EST-ELLE CONNUE AVEC UN DIAGNOSTIC DE MALADIE CARDIAQUE ?

OUI

AIDER LA VICTIME À UTILISER SON VAPORISATEUR DE NITROGLYCÉRINE SI DISPONIBLE (VOIR CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉS)

AIDER LA VICTIME À INGÉRÉ UN TOTAL DE 320MG D'ASPIRINE (VOIR CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉS)

NON

INSTALLER LA VICTIME EN POSITION DE CONFORT (PRÉVENIR LES TRAUMATISMES LIÉS AUX CHUTES)

CONSULTER DANS UN CENTRE HOSPITALIER EN COMPOSANT LE 911

RÉÉVALUER FRÉQUEMMENT LES SIGNES VITAUX DE LA VICTIME (L'ABC)

