



PROTCOLE EN CAS DE TRAUMATISME PAR ENGELURE FLOWCHART

NE JAMAIS FAIRE BOIRE DE BOISSON CONTENANT DE L'ALCOOL

ÉVITER LES MANIPULATIONS BRUSQUES (RISQUE D'ARYTHMIE CARDIAQUE SÉVÈRE).

IL EST POSSIBLE QUE LE RYTHME CARDIAQUE DE LA VICTIME SOIT PLUS BAS QUE LA NORME.

S'INFORMER DE LA DURÉE DE L'EXPOSITION AU FROID.

S'INFORMER DU DEGRÉ DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE OU LA VICTIME A ÉTÉ RETROUVÉ.

S'INFORMER SI LA VICTIME A CONSOMMÉ DES DROGUES, DE L'ALCOOL OU DES MÉDICAMENTS.

LES EXTRÉMITÉS DE LA VICTIME PEUVENT ÊTRE FROIDES ET MENÉ À UNE MAUVAISE LECTURE DE LA SATUROMÉTRIE. NE PAS SE FIER À CETTE LECTURE LE CAS ÉCHÉANT.

TOUTE VICTIME EXPOSÉE À UN ENVIRONNEMENT FROID OU PRÉSENTANT DES SIGNES DE REFROIDISSEMENT DEVRAIT ÊTRE CONSIDÉRÉ HYPOTHERMIQUE.

NE JAMAIS FRICTIONNER OU MASSER LA PEAU D'UNE VICTIME EN HYPOTHERMIE.

NE JAMAIS TENTER DE RÉCHAUFFER SEULE UNE PERSONNE EN HYPOTHERMIE PAR LE PEAU À PEAU.

PROTCOLE EN CAS DE TRAUMATISME PAR ENGELURE (HYPOTHERMIE)

DÉPLACER LA VICTIME, SANS SE-COUCES, VERS UN MILIEU CHAUD

ADMINISTRER DE L'OXYGÈNE À HAUTE CONCENTRATION SI DISPONIBLE (MASQUE D'OXYGÈNE 100%)

RETIRER UNIQUEMENT LES VÊTEMENTS HUMIDES DE LA VICTIME (EN MAINTENANT UNE IMMOBILISATION CERVICALE)

ASSÉCHER LA VICTIME À L'AIDE D'UN LINGE OU D'UNE SERVIETTE SÈCHE

APPLIQUER UN PANSEMENT SEC SUR LA OU LES RÉGION(S) GELÉE(S)

COUVRIR LA VICTIME À L'AIDE D'UNE COUVERTURE CHAUDE OU D'UNE COUVERTURE D'ALUMINIUM

LAISSER RÉCHAUFFER GRADUELLEMENT LA VICTIME SANS APPROCHER D'UNE SOURCE DE CHALEUR DIRECTE

FAIRE BOIRE UNE BOISSON CHAUDE SI LA VICTIME EST ALERTE

RÉÉVALUER FRÉQUEMMENT LES SIGNES VITAUX DE LA VICTIME (L'ABC)

CONSULTER DANS UN CENTRE HOSPITALIER EN COMPOSANT LE 911

