



PROTOCOLE EN CAS DE SURDOSE AUX OPIOÏDES FLOWCHART

SI LA PERSONNE NE RÉAGIT PAS APRÈS 3 MINUTES, DONNEZ UNE DEUXIÈME DOSE DE NALOXONE À LA VICTIME

SI VOUS AVEZ UTILISÉ DE LA NALOXONE INTRANASALE, DONNEZ LA SECONDE DOSE DANS L'AUTRE NARINE.

SI VOUS AVEZ UTILISÉ LA NALOXONE EN INJECTION, UTILISEZ UN NOUVEAU CONTENANT POUR LA SECONDE DOSE.

UNE SURDOSE AUX OPIOÏDES PEUT ÊTRE SUSPECTÉ LORSQU'IL Y A UNE POSSIBILITÉ DE CONSOMMATION DE DROGUES OU DE MÉDICAMENTS.

LES SIGNES ET SYMPTÔMES D'UNE SURDOSE AUX OPIOÏDES SONT:

- VICTIME INCONSCIENTE
- RESPIRATION DIFFICILE, RONFLANTE OU ABSENTE
- PUPILLES EN POINTE D'AIGUILLE
- LÈVRES ET ONGLES BLEUS
- PEAU FROIDE ET MOITE

EN CAS D'ARRÊT CARDIO-RESPIRATOIRE, ADMINISTREZ LA NALOXONE SELON LES RECOMMANDATIONS DU FABRIQUANT.

ADMINISTRER DE LA NALOXONE SI LA VICTIME DÉMONTRE DES SIGNES MARQUÉS DE DÉGRADATION DE L'ÉTAT DE CONSCIENCE OU DE LA RESPIRATION.

LA NALOXONE EST UN MÉDICAMENT POUVANT ÊTRE ADMINISTRÉ INTRANASALE AINSI QU'INTRAMUSCULAIRE. ASSUREZ-VOUS DE SUIVRE LES RECOMMANDATIONS DU FABRIQUANT LORS DE SON ADMINISTRATION OU DE DOSES MULTIPLES (TEMPS ET DOSE).

LA NALOXONE N'A AUCUN EFFET SECONDAIRE.

PROTOCOLE EN CAS DE SURDOSE AUX OPIOÏDES

NIVEAU DE CONSCIENCE

