



## PROCOLE EN CAS DE TRAUMATISME AUX EXTRÉMITÉS FLOWCHART

NE JAMAIS DÉPLACER LE OU LES MEMBRES TRAUMATISÉ(S).

NE JAMAIS DEMANDER À LA VICTIME DE VOUS AIDER LORS DE VOS SOINS.

LES MANIPULATIONS DOIVENT ÊTRE FAITES UNIQUEMENT PAR LE OU LES SECOURISTES DE MANIÈRE LENTE ET CONTRÔLÉES.

ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE ATTELLE EST SÉCURITAIREMENT FIXÉE SUR LA VICTIME ET QU'ELLE EST CONVENABLEMENT REMBOURRÉ AFIN QUE LE MEMBRE NE PUISSE PAS SE DÉPLACER À L'INTÉRIEUR.

SI LE MEMBRE TRAUMATISÉ PRÉSENTE DES SIGNES D'UNE ABSENCE DE CIRCULATION SANGUINE (PERTE DE SENSATION À L'EXTRÉMITÉ AVEC PERTE DE MOTRICITÉ ET EXTRÉMITÉ BLEUE) VOUS DEVEZ TENTER DE REPLACER LE MEMBRE DANS SON AXE. SI LA MANIPULATION CAUSE DE LA DOULEUR, CESSÉ IMMÉDIATEMENT LES MANIPULATIONS.

S'IL S'AGIT D'UNE FRACTURE OUVERTE, IL FAUT ALORS AUSSI APPLIQUER LE PROTOCOLE TRAUMATISME HEMORRAGIQUE.

NE JAMAIS APPLIQUER DE LA GLACE EN CONTACT DIRECTE AVEC LA PEAU.

