



PROTOCOLE EN CAS DE DIFFICULTÉS RESPIRATOIRES D'ORIGINE MÉDICALE FLOWCHART

LE SECOURISTE PEUT RÉPÉTER L'ADMINISTRATION DU VENTOLIN TOUTES LES 10 MINUTES SI LA VICTIME COMPORTE TOUJOURS LES SIGNES D'ADMINISTRATION

TOUJOURS BIEN RINCER LA BOUCHE APRÈS USAGE DU VENTOLIN.

UTILISER LE PROTOCOLE EN CAS DE PLAIE AU THORAX S'IL S'AGIT D'UNE DYSPNÉE D'ORIGINE TRAUMATIQUE.

L'HYPERVENTILATION (RESPIRATION SUPÉRIEURE À 24/MIN) PEUT CAUSER DES ENGOURDISSEMENTS AUX 4 MEMBRES, DES VERTIGES, DES MAUX DE TÊTE ET MÊME UNE PERTE DE CONSCIENCE.

DÈS QU'IL Y A UN CHANGEMENT DANS L'ÉTAT DE CONSCIENCE DE LA VICTIME, SE RÉFÉRER AU PROTOCOLE D'APPROCHE PRIMAIRE.

S'IL Y A UN RISQUE DE RÉACTION ALLERGIQUE, APPLIQUER LE PROTOCOLE RÉACTION ALLERGIQUE DE TYPE ANAPHYLACTIQUE.

PROTOCOLE EN CAS DE DIFFICULTÉS RESPIRATOIRES D'ORIGINE MÉDICALE

