



PROTOCOLE EN CAS DE DOULEUR THORACIQUE FLOWCHART

S'IL S'AGIT D'UNE DOULEUR D'ORIGINE TRAUMATIQUE, SE RÉFÉRER AU BON PROTOCOLE TRAUMATIQUE.

LES DOULEURS THORACIQUES PEUVENT PROVOQUER UN ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE. SOYEZ À L'AFFÛT !

LE SECOURISTE GÉNÉRAL NE POSSÈDE PAS D'ASPIRINE (ASA) NI DE NITROGLYCÉRINE (TNT) DANS SA TROUSSE DE PREMIERS SECOURS ET N'A PAS LA RESPONSABILITÉ D'EN ADMINISTRER.

UNE DOULEUR THORACIQUE PEUT RESSEMBLER AUX SIGNES ET SYMPTÔMES D'UNE INDIGESTION. SOYEZ PRÉCIS LORS DE VOTRE QUESTIONNAIRE AFIN D'APPLIQUER LE BON PROTOCOLE D'INTERVENTION.

SI LA VICTIME PRÉSENTE DES DOULEURS THORACIQUES ET QUE VOUS LES SOUPÇONNEZ D'ORIGINE CARDIAQUE, VOUS POUVEZ ENCOURAGER LA VICTIME À PRENDRE QUATRE COMPRIMÉS DE 81 MG OU UN COMPRIMÉ DE 325 MG D'ASPIRINE À CROQUER SI LA VICTIME N'EST PAS ALLERGIQUE OU SI ELLE N'A PAS EU D'HÉMORRAGIE RÉCEMMENT. MÉDICATION NON RÉPÉTABLE.

PROTOCOLE EN CAS DE DOULEUR THORACIQUE

