



PROTOCOLE EN CAS D'ÉTAT DE CHOC FLOWCHART

S'ASSURER QU'IL N'Y A AUCUNE HÉMORRAGIE EXTERNE NON CONTRÔLÉE.

SI VOUS SUSPECTEZ UNE HÉMORRAGIE INTERNE, VOUS POUVEZ APPLIQUER DU FROID AU NIVEAU DU SITE.

SOYEZ VIGILANT, DANS DES CAS D'HYPOXIE CÉRÉBRALE, LES PATIENTS PEUVENT DEVENIR AGITÉS.

DANS DES CAS DE TRAUMATISMES CÉRÉBRAUX MAJEURS, LES PATIENTS PEUVENT VOMIR EN JET.

VÉRIFIER LA POSSIBILITÉ D'UN PROBLÈME DIABÉTIQUE DE TYPE HYPOGLYCÉMIQUE.

VÉRIFIER LES SIGNES VITAUX FRÉQUEMMENT ET FAIRE ATTENTION AUX RISQUES D'ARRÊT CARDIO-RESPIRATOIRE.

DÙ À UNE MAUVAISE TENSION ARTÉRIELLE, LES EXTRÉMITÉS DE LA VICTIME PEUVENT ÊTRE FROIDES ET MENER À UNE MAUVAISE LECTURE DE LA SATUROMÉTRIE. NE PAS SE FIER À CETTE LECTURE LE CAS ÉCHÉANT.

NE RIEN DONNER À BOIRE NI À MANGER À LA VICTIME.

PROTOCOLE EN CAS D'ÉTAT DE CHOC

LAISSER LA VICTIME EN POSITION TROUVÉE EN MAINTENANT UNE IMMOBILISATION CERVICALE

SI DISPONIBLE, EFFECTUER UNE LECTURE DE LA SATUROMÉTRIE INITIALE DE LA VICTIME

ADMINISTRER DE L'OXYGÈNE À HAUTE CONCENTRATION SI DISPONIBLE (MASQUE D'OXYGÈNE 100%)

DESSERRER LES VÊTEMENTS

COUVRIR LA VICTIME À L'AIDE D'UNE COUVERTURE CHAUDE OU D'UNE COUVERTURE D'ALUMINIUM

RÉÉVALUER FRÉQUEMMENT LES SIGNES VITAUX DE LA VICTIME (L'ABC)

CONSULTER DANS UN CENTRE HOSPITALIER EN COMPOSANT LE 911

